



# Etacortilen<sup>®</sup>

Dexametasona



Colirio 1.14 mg/mL



Caja con 4 sobres de 5 unidades monodosis con 0.3 mL.

#### INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Etacortilen<sup>®</sup> colirio está indicado en el tratamiento de la conjuntivitis alérgica estacional, blefaritis y blefarokonjuntivitis alérgica, queratoconjuntivitis alérgica, escleritis, epiescleritis, uveitis.

#### CONTRAINDICACIONES

Etacortilen<sup>®</sup> colirio está contraindicado en queratitis epitelial por herpes simples (queratitis dendrítica), en infecciones periódicas agudas por vacunas, varicela y otras enfermedades virales de la córnea y conjuntiva, en infección de los ojos causada por micobacterias, en enfermedades fúngicas de las estructuras oculares, en lesiones o abrasiones de córnea y por hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

#### PRECAUCIONES GENERALES

Deberá ser considerada la posibilidad de infecciones fúngicas persistentes de la córnea después del uso prolongado de la dosificación con corticoesteroides. El uso prolongado puede resultar en hipertensión ocular y/o glaucoma por lo que su uso debe realizarse bajo estricto control médico. Durante el uso prolongado por 10 días o más, la presión intraocular deberá ser monitoreada de rutina. El fosfato de dexametasona puede ser utilizado durante el embarazo únicamente si el beneficio potencial de la madre justifica el riesgo potencial para el embrión o el feto. Los esteroides tópicos son absorbidos sistémicamente. Por lo tanto, debido a las potenciales reacciones adversas del fosfato sódico de dexametasona en lactantes, debe tomarse la decisión de discontinuar la lactancia o discontinuar el medicamento, tomando en cuenta la importancia del medicamento para la madre. El uso en pacientes pediátricos, queda estrictamente bajo control del médico.



#### MODO DE EMPLEO

Una vez abierto el sobre de Etacortilen<sup>®</sup> colirio que contiene las 5 unidades monodosis, éstas deberán ser utilizadas dentro de los 28 días siguientes.

1. Separar un contenedor monodosis de la tira de cinco unidades.
2. Abrir el envase girando la parte superior en sentido de las manecillas del reloj, sin jalar.
3. Invertir la posición del envase y aplicar la dosis indicada en cada ojo, apretando ligeramente el envase.
4. Deséchese el sobrante después de su uso.

Reg. No. 002M2006 SSA IV

Hecho en Italia por:

S.I.F.I. S.p.A.

Via Ercole Patti 36 (loc. Lavinaio)

95025 Aci Sant'Antonio (CT)

Italia

\*Marca Registrada

Distribuido por:

Laboratorios BioSerum México, S.A. de C.V.

Poniente 44 No. 2672

Colonia San Salvador Xochimanca

Delegación Azcapotzalco - C.P. 02870 México, D.F.

